



AVOINE DÉCORTIQUÉE BRODIFACOUM FICHE TECHNIQUE

**GAMME
COLLECTIVITÉS**



DESRIPTIF PRODUIT

Matière active : **Brodifacoum 0,0010 %**
Contient un agent amérisant (0,001%)
A.M.M FR-2016-0019 - "LFT BRODI 10"

Support :	Avoine décortiquée
Couleur :	Bleu
Cibles	Rat et souris
Usages autorisés :	Grand public et les professionnels non spécialistes 3D.
Lieu d'utilisation :	interieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles
Réf. : RA945	Carton de 10 Kg (sachet de 25g)

INFORMATIONS COMMERCIALES

Produit adapté pour les collectivités dans le cadre d'une distribution à la population. 70 sachets zippés étanches et étiquetés sont inclus pour permettre la remise d'un volume conforme à la législation biocide (moins de 150g) et assurer un haut niveau d'information pour les utilisateurs.

Appât prêt à l'emploi pour un usage polyvalent contre les rats et souris. Bonne appétence en milieux secs.

Appât à base de Brodifacoum :

- Efficace par ingestion unique ou consommations répétées.
- Pas de méfiance des rongeurs à l'égard de l'appât.
- Antidote disponible (vitamine K1 sous contrôle médical).

Non détecté par les rongeurs, l'agent d'amertume (Benzoate de Denatonium) prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme. Les rongeurs meurent quelques jours après consommation, ce qui n'éveille donc pas la méfiance de leurs congénères. Les rongeurs consomment peu de nourriture sur le même poste, aussi faut-il les multiplier pour accroître les chances de succès.

TOXICOLOGIE

Indication pour le médecin : LFT BRODI 10 contient un rodenticide anticoagulant, un traitement à la vitamine

K1 devrait être nécessaire pendant une longue période.
Centre antipoison : INRS 01 45 42 59 59

MÉTHODES D'APPLICATION

Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appât sécurisées étiquetées. Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles.

Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l'espèce ciblée. Si possible, éliminer toute source de compétition alimentaire sur le site. Par mesure de sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux (risques d'intoxication secondaire).

Doses d'utilisation :

Contre les rats : 180 à 200g "d'appât par point" tous les 5 à 10 mètres.
Contre les souris : 40g "d'appât par point" tous les 1 à 2 mètres. Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés par poste d'appâtage à la dose efficace recommandée.

Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés.

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION.
avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

Page 1 sur 1
Mise à jour le 05.02.18

FDS disponible sur www.aedes.fr